

Verstellbares Laparoskopische Magen-Band

Anweisungen für den Patient wenn er zu Hause ankommt

Auf Anweisungen des Arztes Dr. Bruno Dillemans: wenn der Patient zu Hause ankommt, sollte er folgenden Anweisungen beachten:

- Bis der Patient fähig ist, sich normal zu bewegen, müssen Trombose Strümpfe getragen werden.
- Die folgende Medikamente sollten eingenommen werden:
 - Subcutaneous LMWH (Clexane 40 mg oder Fraxiparine 0.4) 10 Tage lang nach dem zu Hause ankommen sind.
 - Zantac 150 mg, 1 mal am Tag ,28 Tage lang nach dem zu Hause ankommen sind.
- Zehn Tage nach chirurgischem Eingriff besuchen Ihren Hausarzt um zu überprüfen, dass Ihre Wunden normal heilen. Die Wunden werden intradermally mit auflösbaren Fäden geschlossen. Diese müssen nicht entfernt werden.
- Seien Sie bitte sicher, dass Sie den Rat oder Anweisungen, den Sie von dem Ernährungsberater im Krankenhaus erhalten haben, streng zu folgen.
- Die Verwendung von Aspirin oder entzündungshemmende Medikamente (wie Ibuprofen, Nurofen) wird verboten, da diese Magengeschwüre verursachen können.
- Bei Schmerz können paracetamol oder paracetamol mit Kodein eingenommen werden.

Dr.. Bruno Dillemans
AZ Sint-Jan Krankenhaus
Brügge
Belgien